

# ഷിറ്റാക്കെ കുൺ കൃഷി



മഷ്രം ഗവേഷണ ലാണ്  
വിള സംരക്ഷണ വിഭാഗം



ICAR-ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ റിസർച്ച്

## ആമുഖം

- ❖ ലെന്റീനൂല എഡോഡസ് (ബെർക്കി) പെഗ്ഗർ എന്ന ഈയിനം ജാപ്പനീസ് (ഷിറേക്ക്), ചൈനീസ് (ഷിയാങ്ങു), ഫ്രഞ്ച് (ലെന്റീൻ) പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നു
- ❖ ചൈനയിൽ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ മരത്തടികളിൽ ഷിറ്റാക്കെ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതി 1914-ലാണ് ആരംഭിച്ചത്.
- ❖ ചൈന 1979-ൽ മരപ്പൊടി മാധ്യമമുപയോഗിച്ച് ബാഗുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഷിറ്റാക്കെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ വിജയിച്ചു
- ❖ നിലവിൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഭക്ഷ്യയോഗ്യ കൃണാണ് ഷിറ്റാക്കെ
- ❖ ധാരാളം പോഷകഗുണവും ഔഷധഗുണമുള്ളതുമാണിവ
- ❖ ഇവയിൽ എറിറ്റാഡെനിൻ (കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന അമിനോ ആസിഡും) ലെന്റീനൻ (ക്യാൻസർ പോലുള്ള മുഴകളെ തടഞ്ഞു പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന  $\beta$ -ഗ്ലൂക്കൻ) തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ കാൻസർ, എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിനായി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
- ❖ ചൈനയിലെ പരസ്കൃ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണക്ക ഷിറ്റാക്കെ കൃണുപയോഗത്തിന് ചരിത്രപ്രാധാന്യമേറിയതുണ്ട്
- ❖ നിലവിൽ ലോകത്തെ കുൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 22 ശതമാനമാണ് ഷിറ്റാക്കെ കുൺ.


**കൃഷിരീതി**

**1. ഔട്ട്ഡോർ (പുറവാതിൽ) കൃഷി**

- a. കനമുള്ള തടിക്കഷണങ്ങളിൽ മരയാണി തറച്ച് ഇനോക്കുലറ്റ് ചെയ്ത് നിലത്തു സമാന്തരമായിടുന്നു. ഇതിനുമേൽ അറക്കപ്പൊടി വിതറി ഭാഗികമായി കുഴിച്ചിടുന്നു.
- b. ഓക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ്നട്ട് മരങ്ങളുടെ തടിയിലാണ് മരയാണി തറക്കുന്നത്.

**2. ഇൻഡോർ (മുറിക്കുള്ളിലെ) കൃഷി**

- a. ഇൻഡോർ കൃഷിക്ക് അണുവിമുക്തമാക്കിയ അറക്കപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാം



**കവറിലെ കൃഷിയിലെ ഘട്ടങ്ങൾ**

- 1. മാധ്യമം തയ്യാറാക്കൽ
- 2. അണുനശീകരണം
- 3. ബാഗ് നിറക്കലും വിത്തിടീലും
- 4. സ്റ്റോൺ റണ്ണിംഗ്
- a. കോളനി രൂപപ്പെടുൽ
- 5. തണുത്ത വെള്ളം പ്രയോഗം
- b. ആവരണം
- 6. ക്രോപ്പിംഗ് / വിളവെടുപ്പ്
- c. മുള പൊട്ടൽ (ബ്ലിസ്റ്ററിങ്)
- d. ബ്രേണിങ്

**മാധ്യമം തയ്യാറാക്കൽ**

മാധ്യമത്തിന്റെ പോഷകങ്ങളും ഘടനയും പ്രധാനമാണ്. മരപ്പൊടിയുടെ വലിപ്പം 0.85 മില്ലീമീറ്ററിൽ കുറവായിരിക്കരുത്. ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന തടി, മരപ്പൊടി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫോർമുലേഷനുകൾ.

**ഷിറ്റാക്കെ കൃഷിക്കുള്ള മരപ്പൊടി അധിഷ്ഠിത മാധ്യമം**

**1. വു (1993)**

- മരപ്പൊടി : 100 kg
- ഗോതമ്പ് / നെല്ല് തവിട് : 23.25 kg
- ജീപ്പം : 2.5 kg
- കാൽഷ്യം സുപ്പർ : 0.5 kg
- ഫോസ്ഫേറ്റ്
- സൂക്രോസ് : 1.0-1.5 kg
- വെള്ളം : 10-140 kg

**2. സ്റ്റേമറ്റ് (1993)**

- മരപ്പൊടി : 100 lb (or 64 gal)
- തടിചിപ്പുകൾ : 50 lb (or 32 gal)
- നെല്ല് / വരക് : 40 lb (or 8 gal)
- തവിട്
- ജീപ്പം : 5-7 lb
- വെള്ളം : 60%

**3. ന്യൂസിലൻഡ് ഫോസ്ട്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്**

പൈൻ	: 6 ഭാഗം
മരത്തടി	: 1 ഭാഗം
ധാന്യം	: 1 ഭാഗം

**4. വൈക്കോൽ മാധ്യമം (ഓയ്,1996)**

നെല്ല് വൈക്കോൽ	: 50 kg
ഗോതമ്പ് വൈക്കോൽ	: 20 kg
അറക്കപ്പൊടി	: 20 kg
സൂക്രോസ്	: 1.3 kg
കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്	: 1.5 kg
സിട്രിക് ആസിഡ്	: 0.2 kg
കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്	: 0.5 kg

**ICAR-IIHR മാധ്യമം (2006)**

അറക്കപ്പൊടി	: 10 kg
തടിചിപ്പുകൾ	: 10 kg
നെല്ല് /ഗോതമ്പ് തവിട്	: 4 kg
കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്	: 720 g
വെള്ളം	: 60% (ഒരു കി.ഗ്രാം ഉിങ്ങിയ മാധ്യമത്തിന് ഒന്നര ലിറ്റർ)

**മാധ്യമം തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം**

- ❖ മരപ്പൊടി, തടിചിപ്പ്, തവിട്, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്, വെള്ളം എന്നിവ കൈകൊണ്ടോ സബ്സ്ട്രേറ്റ് മിക്സറിലോ കലർത്തുക.
- ❖ നിലവിൽ, പോളിപ്രൊപ്പിലിൻ കവറുകളാണ് (200-220 ഗേജ്, 1 കിലോയ്ക്ക് 8x16 ഇഞ്ച്) ഷിറ്റാക്കെ കൂൺ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം

**സബ്സ്ട്രേറ്റ് മിക്സർ മെഷീൻ**



**അണുനശീകരണം:**

- ❖ ഒരിഞ്ച് വ്യാസമുള്ള PVC റിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ബാഗിൽ ഗളമുണ്ടാക്കി അതിൽ വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യാത്ത പരുത്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു
- ❖ ശേഷം ഈ ബാഗുകൾ ഓട്ടോക്ലേവിൽ 121 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ 15 lbs സമ്മർദ്ദത്തിൽ (ബാഗിന്റെ തൂക്കമനുസരിച്ച് 1 കിലോയ്ക്ക് 90 മിനിറ്റും 2 കിലോ ബാഗുകൾക്ക് 1200 മിനിറ്റും) അണുവിമുക്തമാക്കുന്നു.

ഐ.സി.എ.ആർ ഐ.ഐ.എച്ച്.ആർ. രൂപകൽപന ചെയ്ത സോളാർ - മൾട്ടിഫ്യൂവൽ വെർട്ടിക്കൽ ഓട്ടോക്ലേവ്



- ശേഷി : പ്രതിദിനം 250-300 വൈക്കോൽ കവറുകളുടെ (1 കി. ഗ്രാം) അണുനശീകരണം
- ഇന്ധനം : വൈദ്യുതി, എൽപിജി ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വിറക്
- പ്രയോജനങ്ങൾ : കൂടുതൽ സ്പെയ്-സമയ കാര്യക്ഷമത, മൾട്ടിഫ്യൂവൽ

**സ്റ്റോണിങ് / വിത്തിടീൽ**

- ❖ യൂഎസിൽ പൊതുവായി വിത്തും മുഴുവൻ മാധ്യമവും നന്നായി കലർത്തി വലിയ ബാഗുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചൈനയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ചെറിയ ബാഗുകളിൽ മാധ്യമത്തിന് മുകളിൽ മാത്രമായി കൂൺവിത്തു വിതറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
- ❖ വിത്തും മാധ്യമവും പൂർണ്ണമായി കലർത്തുന്നത് വളർച്ചാ നിരക്ക് വളരെ വേഗത്തിലാക്കുന്നു. ഹീറ്റ് സീൽ ചെയ്ത വലിയ ബാഗുകളിൽ മൈക്രോപോറസ് ബ്രീത്തിംഗ് ഫിൽട്ടറുകളുള്ളത് കൊണ്ട് ഭാഗികമായി വിത്ത് നിറച്ച് കൈ കൊണ്ടോ മിക്സിംഗ് ലോ നന്നായി കലർത്താവുന്നതാണ്

**സ്റ്റോൺ റണ്ണിങ്**

- ❖ ഫംഗസിന്റെ മൈസീലിയൽ വളർച്ചയും മുപ്പത്തിലും നടക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ്
- ❖ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഘട്ടത്തിൽ 5 സ്റ്റേജുകളാണുള്ളത്
- ❖ എല്ലാ ഷിറ്റാക്കെ ഇനങ്ങളും 24-25°C ഈഷ്യാവിൽ മൈസീലിയൽ വളർച്ച കാണിക്കുന്നു. സ്റ്റോൺ റൺ സമയത്ത് വെളിച്ചം ആവശ്യമില്ല
- ❖ ഇനവും കൃഷിരീതിയുമനുസരിച്ച് സാധാരണയായി സ്റ്റോൺ റണ്ണിന്റെ ദൈർഘ്യം 1-4 മാസമാണ്.

**ഘട്ടം 1: മൈസീലിയൽ വളർച്ച**

- ❖ വിത്തിടീലിനെ തുടർന്ന് ഷിറ്റാക്കെയുടെ മൈസീലിയം വെളുത്ത നിറത്തിൽ മാധ്യമത്തിൽ പടർന്നു വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു
- ❖ വളർച്ചയുടെ ഈ താരതമ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഫംഗസിന്റെ മെറ്റബോളിസം കൂടുതലാണ്. എൻസൈമുകൾ മാധ്യമത്തിലെ സങ്കീർണ്ണ ഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ലളിത തന്മാത്രയാക്കുന്നത് വഴി മൈസീലിയത്തിന് പോഷണം ആഗിരണം ചെയ്ത് വേഗത്തിൽ വളരുവാൻ സാധിക്കുന്നു



**ഘട്ടം 2: മൈസീലിയൽ ആവരണം രൂപപ്പെടുത്തൽ**

- ❖ വിത്തിടീലിനെ തുടർന്ന് ഷിറ്റാക്കെയുടെ മൈസീലിയം വെളുത്ത നിറത്തിൽ മാധ്യമത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പഞ്ഞി പോലെ പടർന്നു വളരുവാൻ തുടങ്ങുന്നു
- ❖ എൻസൈമുകൾ മാധ്യമത്തിലെ സങ്കീർണ ഘടകങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് ലളിത തന്മാത്രയാക്കുന്നു



**ഘട്ടം 3: മുളപൊട്ടൽ / ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റേജ്**

- ❖ മൈസീലിയൽ ആവരണത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ ചോളപ്പൊരി പോലെ മുളപൊട്ടിവരുന്നു
- ❖ സാധാരണയായി മാധ്യമത്തിൽ മൈസീലിയ പൂർണ്ണമായി ആവരണം ചെയ്ത ശേഷമാണ് മുളപൊട്ടുന്നത്



**ഘട്ടം 4: ബ്രാണിങ്ങ് സ്റ്റേജ്**

- ❖ ബാഗിനുള്ളിൽ 50% തവിട്ടുനിറമാകുമ്പോൾ, കവർ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത്, മുറിയിൽ 60-70% ആർദ്രത നിലനിർത്തേണ്ടതാണ്. വായുസഞ്ചാരം തവിട്ടു നിറം കൂട്ടുന്നു എന്നതിനും നല്ല കട്ടിയുള്ള ഉറച്ച കൂണുകളുണ്ടാവുന്നതിനും സഹായിക്കും.



**ഘട്ടം 5: ക്രോപ്പിംഗ് / കൂൺ വളർച്ച**

- ❖ വിത്ത് വളർന്നു തവിട്ടു നിറത്തിൽ കട്ടിയുള്ള മുളകളായ ശേഷം കൂൺ വളരുവാൻ അനുവദിക്കണം. ഇതിനായി തവിട്ടുനിറത്തിലെത്തിയ തടങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
- ❖ കൂൺ വളർച്ച ത്വരിതത്തിലാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇവയാണ്.
- ❖ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കൽ (12 ഡിഗ്രി താപനിലയിൽ 2-4 മണിക്കൂർ; റോയ്സ് 1997)
- ❖ താപനിലയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ
- ❖ ഉയർന്ന ആർദ്രത
- ❖ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്യലും ഓക്സിജൻ പ്രദാനവും
- ❖ മറ്റ് ആഘാതങ്ങൾ (ഇളക്കം, മെറ്റൽ സൂചി കൊണ്ടുള്ള തട്ടും വെള്ളം കയറ്റലും, തടങ്ങൾ തലകീഴായി കമഴ്ത്തുന്നത്)



**കുൺ/ബസിഡിയോകാർപ്പ് രൂപീകരണം**

- ❖ പ്രൈമോഡിയ ഉണ്ടായശേഷം തവിട്ടു നിറത്തിലുള്ള ചെറു കുണുകളായി വളർന്നു, വലിപ്പം കൂടുന്നു, ശേഷം, കുണിന്റെ മേൽ ഭാഗം (കൂട) ഇളം തവിട്ടു നിറമാകുന്നു



**വിളവെടുപ്പ്**

- ❖ കുൺതൊപ്പികൾ ചുരുണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുൺ വിളവെടുക്കുക
- ❖ വിളവെടുക്കുമ്പോൾ മാധ്യമത്തിന് കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. വിളവെടുപ്പിനു രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് കുൺ മുറിയിലെ ആർദ്രത 60 - 70 % ആയി കുറയ്ക്കുന്നത് കുണിന്റെ ഗുണമേന്മയും സൂക്ഷിപ്പുകാലവും കൂട്ടുന്നു.
- ❖ പാക്കിങ്ങ് മുൻപ് തണ്ടിൻറെ ചുവടു മുറിച്ചു മാറ്റണം. വിളവെടുത്ത-യുടനെയോ 5 - 7 ദിവസം വരെ ശീതീകരിച്ച് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യാം. കൂടാതെ, അവനിൽ വെച്ചുണക്കി പൊടിയാക്കിയോ അല്ലാതെയോ വിപണനം ചെയ്യാം.

**ഷിറ്റാക്കെ കൃഷിയിലെ രോഗ-കീടങ്ങൾ**

- ❖ പല കീടങ്ങളും രോഗാണുക്കളും കൃഷിയിൽ പൂർണ്ണമായ നഷ്ടം വരുത്തിയേക്കാം. ഷിറ്റാക്കെ കുണിൻറെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുചിത്വ പരിപാലനം കൃഷിയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്.

**കുൺ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെടുക**

Institute Technology Management Unit  
 ICAR-Indian Institute of Horticultural Research, Hessaraghatta Lake P.O.  
 Bengaluru – 560089 , Email : [itnu.iibr@icar.gov.in](mailto:itnu.iibr@icar.gov.in)  
 Contact No.: 080 – 23086100 , Extn.: 431

**കുൺവിത്ത് ബുക്കിംഗിന് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ**

Mobile No: 7090949605, Tel. No. 080 – 23086100 , Extn.: 347, 348, 349  
 Email : [mushroomiibr@gmail.com](mailto:mushroomiibr@gmail.com)  
 Website : [www.iibr.res.in/mushroom](http://www.iibr.res.in/mushroom)

**Compiled and Edited By : Dr. Chandrashekara C.**

**Contributors : Dr. G. Senthil Kumaran, Dr. Meera Pandey & Dr. Chandrashekara C.**

**Malayalam Translation: Dr. Anushma P. L.**

**Printing Funded By: AICRP on Mushroom**

പ്രസിദ്ധീകരണം : ഡയറക്ടർ

ഇന്ത്യ-ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ റിസർച്ച്

ഹെസറഗഘട്ട ലെയ്ക്ക് പോസ്റ്റ്, ബെംഗളൂരു-560089, ഇന്ത്യ

ഫോൺ: 080 23086100

ഇ-മെയിൽ: [director.iibr@icar.gov.in](mailto:director.iibr@icar.gov.in) വെബ്സൈറ്റ്: [www.iibr.res.in](http://www.iibr.res.in)

June 2024

